

Inleiden van de bevalling

De gynaecoloog of verloskundige heeft in overleg met u besloten de bevalling in te leiden.

Er zijn verschillende methoden van inleiding:

- Ballonkatheter
- Medicijnen
- Vliezen breken

Controle van de conditie van de baby

Bij elke stap om je bevalling te laten starten, wordt er een CTG (hartfilmpje) gemaakt van de baby. Zo wordt er gezien hoe het met de baby gaat. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Je krijgt 2 banden om je buik. Met deze banden worden 2 knoppen vastgezet. De ene knop meet de hartslag van de baby en de andere knop meet of je weeën hebt.

Om te kunnen bevallen moet je baarmoedermond zacht worden en 2 of 3 centimeter open gaan staan. Als dit nog niet zo is, kan dit met een ballonkatheter of medicijnen worden bereikt.

Een ballon om voor ontsluiting te zorgen

Als na een inwendig onderzoek is vastgesteld dat de baarmoedermond nog niet 'rijp' genoeg is, kan er in overleg met jou worden besloten een ballon te plaatsen. Dit gebeurt op het Moeder en Kind Centrum. De dag en hoe laat wordt van tevoren met jou besproken.

De gynaecoloog of verloskundige brengt een speculum (eendenbek) in je vagina. Daarna wordt er een zacht slangetje in je baarmoedermond gebracht. Aan het einde van het slangetje zit een ballon. Deze wordt gevuld met water totdat deze ongeveer 2 tot 3 centimeter is. De ballon helpt je baarmoeder om hormonen aan te maken. De hormonen zorgen ervoor dat je ontsluiting krijgt en dat je baarmoedermond zacht wordt. De ballon blijft in je baarmoedermond zitten.

Meestal kun je na het inbrengen van de ballon naar huis. Je krijgt dan een kaartje mee met uitleg wanneer je moet bellen. Daarnaast krijg je een slaaptabletje mee, die je zo nodig mag innemen. De ochtend na het plaatsen van de ballon meld je je om 7 uur op het Moeder en Kind Centrum.

Soms is het medisch gezien noodzakelijk dat je na het inbrengen van de ballon op het Moeder en Kind Centrum blijft. Je partner (of iemand anders) mag ook blijven overnachten. Dit hoor je vooraf, zodat je spullen kunt meenemen.

De ochtend na het plaatsen van de ballon wordt er een inwendig onderzoek gedaan om te beoordelen of je baarmoedermond voldoende open staat en de ballon verwijderd kan worden.



Medicijnen om voor ontsluiting te zorgen


Soms helpt de ballon niet genoeg of wil je liever geen behandeling met een ballon. Dan kun je medicijnen slikken. Het medicijn heet misoprostol. Dit zorgt ervoor dat je baarmoedermond zacht wordt en open gaat staan.

Dit medicijn mag je maximaal 4 keer per dag innemen. Het beste overdag met minimaal 4 uur er tussen. Soms breken spontaan de vliezen na het innemen van de medicijnen of krijg je weeën. Als het slikken van medicatie een probleem is of niet genoeg werkt, kan in overleg met jou en de gynaecoloog worden besloten om de tabletten vaginaal in te brengen.

Vliezen breken en zorgen dat je weeën beginnen

Als je baarmoedermond zacht is en 2 tot 3 centimeter open staat, worden je vliezen gebroken. Dit gebeurt meestal in de ochtend.

Via je vagina wordt er een haakje naar binnen gebracht, waarmee de vliezen gebroken worden. Dit doet geen pijn.



Soms beginnen daarna de weeën, maar meestal is het nodig om de weeën met medicatie te laten beginnen. Het medicijn heet oxytocine. Je krijgt het via een slangetje in je bloedvat (infuus). Je krijgt steeds iets meer medicijn, totdat je regelmatige weeën krijgt en je weeën sterk genoeg zijn.

Er wordt regelmatig inwendig onderzoek gedaan om te controleren of de ontsluiting vooruitgaat. Daarnaast wordt de baby continue gecontroleerd met het CTG.

We kunnen een draadloos CTG gebruiken, zodat je nog makkelijk kunt bewegen en eventueel onder de douche of in bad kunt.

Afspraken

- De inleiding vindt plaats op een afgesproken tijd op het Moeder en Kind Centrum, afdeling A1.
- Heb je nog vragen, dan bel je met het Moeder en Kind Centrum (0475) 382345.
- Je partner (of iemand anders) mag blijven slapen.
- Bezoektijden zijn van 8.00 uur tot 20.00 uur.
- Kom je in de ochtend voor het breken van de vliezen, dan verzoeken we je rond 6.00 uur te bellen met het Moeder en Kind Centrum om te vragen of er plek is voor de inleiding.
- Door drukte kan soms een inleiding niet doorgaan. De reden hiervoor is dat we veilige zorg willen en moeten bieden. Dit wordt altijd in samenspraak met de artsen besloten.

Meer informatie

Meer informatie over het inleiden van de bevalling vindt u op de website DeGynaecoloog.nl van de NVOG, onder andere de informatiefilm [Inleiden van de bevalling](#).

Team MKC

Telefoonnummer (0475) 38 2345



Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34279670 - Verloskunde - mei 2024