

Perifere zenuw behandeling

PRF van de perifere zenuw

Samen met uw arts heeft u besloten tot een PRF-behandeling van de perifere zenuw tegen pijn. Perifere zenuwen zijn de zenuwen van en naar organen en weefsels. Bij een PRF-behandeling maken we gebruik van korte stroomstootjes (Pulsed Radio Frequente stroom) om de pijnprikkels van de zenuw te stoppen.

Belangrijk!

Gebruikt u bloedverdunners (zoals Sintrom, Marcoumar, Praxada, Plavis, Ascal of een andere bloedverdunner)? Dan moet u hier mogelijk een paar dagen voor de behandeling mee stoppen. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.

- Bent u zwanger? Geef dit dan door.
- Bent u allergisch voor röntgencontrastvloeistof of jodium? Meld dit aan de arts of verpleegkundige.
- Wij adviseren u tot tenminste 12 uur na de behandeling geen voertuigen te besturen en/of gevaarlijke machines te bedienen. Zorg daarom dat iemand u naar huis brengt.

Vorbereiding

- U kunt op de dag van de behandeling gewoon eten en drinken.
- Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen zoals altijd.
LET OP met de bloedverdunners. Deze neemt u zoals afgesproken met de behandelend arts.
- Wij adviseren u om geen waardevolle spullen of geld mee te nemen naar het ziekenhuis.
- U krijgt tijdens de behandeling een operatie-schort aan. U kunt als u wilt een badjas en slipper of sloffen meenemen.

De dag van de behandeling

U meldt zich in de centrale hal van het ziekenhuis aan bij de aanmeldzuil met uw identiteitsbewijs. U krijgt een afspraakticket. Daarop vindt u het tijdstip van uw afspraak en het routenummer naar de Pijnpoli. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de poli pijngeneeskunde. Het afspraakticket scant u bij de aanmeldzuil op de poli.

Houdt u er rekening mee dat de opname 1½ tot 2½ uur kan duren. Soms duurt het iets langer.

De behandeling

Na een plaatselijke verdoving van de huid plaatst de anesthesioloog een naald bij de zenuw. Dit gebeurt met hulp van röntgenbeelden of echoapparatuur. Met kleine teststroompjes wordt gecontroleerd of de naald goed zit.

Daarna behandelt de anesthesioloog de zenuw met radiofrequente golven (PRF). Deze stroomstootjes remmen het doorgeven van pijnprikkels door de behandelde zenuw, waardoor de pijn minder wordt.

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de wachtruimte.

De verpleegkundige vertelt u hoe laat u naar huis mag.

Na ongeveer 3 maanden heeft u een (telefonische) controle afspraak bij de arts of pijnverpleegkundige.

Resultaat van de behandeling

Het kan een paar dagen tot weken duren voor u resultaat merkt. Misschien merkt u al eerder verbetering van de pijnklachten. Soms zal een herhaling of een aanvullende behandeling nodig zijn. Tijdens een controle afspraak bespreekt de specialist of pijnverpleegkundige het resultaat en zo nodig de verdere behandeling met u.

Mogelijke bijwerkingen

- Soms krijgt u last van napijn. Deze napijn kan een paar dagen tot weken duren, maar verdwijnt bijna altijd. Zo nodig kunt u een pijnstillert innemen (bijv. paracetamol).
- Na inspuiten van ontstekingsremmers (corticosteroiden) kunnen bij vrouwen opvliegers ontstaan en kan de menstruatie korte tijd in de war raken.
- Heeft u diabetes (suikerziekte) en gebruikt u insuline, dan kunnen soms uw bloedsuikers een paar dagen verhoogd zijn.
- U kunt minder gevoel hebben in de huid rondom de behandelde zenuw.
- Er kan krachtsverlies optreden in het behandelde gebied, arm of been.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of u kunt contact opnemen met de poli Pijnbestrijding: (0475) 38 2128.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34292270 - Pijnpoli - juni 2024