



Open verbinding neus

Soms ontstaat er na het trekken van een tand of kies in de bovenkaak een gaatje in het kaakbot, omdat het kaakbot boven de wortels van de tanden en kiezen heel dun is en de wortels hierin doorlopen. Dit gaatje vormt een open verbinding van de neusbijholte met de mondholte. Hierdoor kan er speeksel in de neusbijholte komen. Door bacteriën in het speeksel kan er een ontsteking in de neusbijholte ontstaan. Om dit te voorkomen sluit de kaakchirurg de open verbinding met de neus.

In deze folder kunt u lezen hoe de werkwijze is bij het sluiten van een open verbinding met de neus. Welke nazorg nodig is en welke complicaties kunnen optreden.

De folder geeft algemene informatie. Mocht bij u de algemene regel niet gelden, dan wordt u hierover mondeling geïnformeerd door de kaakchirurg, de verpleegkundige of de tandartsassistentente.

Met vragen kunt u bij de poli Mond-Kaak-Aangezichts-chirurgie (MKA) terecht.

Sluiten open verbinding met de neus

Voor het sluiten van de open verbinding wordt plaatselijke verdoving gebruikt. De verpleegkundige/tandartsassistentente dekt het gebied steriel af.

De kaakchirurg sluit de open verbinding door een stukje tandvlees van het kaakbot los te maken en over het gaatje te plaatsen. Hierna wordt het gehecht.

De hechtdraad bestaat uit materiaal dat na 12 tot 14 dagen vanzelf oplost. U hoeft hiervoor niet terug te komen.

De behandeling duurt gemiddeld 15 minuten.

Meestal is een gaasje op de wond aangebracht. Dit mag na een half uur worden verwijderd.

Het tandvlees is na ongeveer twee weken dichtgegroeid. Het kaakbot heeft een paar maanden nodig om dicht te groeien.

Nazorg

De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Tot die tijd mag u niet eten of drinken om verslikken en/of bijten op de ongevoelige lip, tong of wang te voorkomen.

U begint meteen met koelen om zwelling een beetje te voorkomen. Koelen kan met ijsklontjes in een zakje en een washand of een icepack. U koelt met tussenpozen. Maximaal 5 minuten koelen, ongeveer een half uur niet, dan weer 5 minuten koelen, enzovoort. Dit herhalen tot u naar bed gaat.

Goede mondhygiëne is belangrijk voor een snelle genezing.

Houd de mond goed schoon door na elke maaltijd uw tanden, kiezen en tandvlees te borstelen. Ook over het wondje moet geborsteld worden.

Ga **niet** spoelen, dit voorkomt nabloeden van de wond. **Vijf** dagen niet spoelen, ook niet na het tanden poetsen.

Omdat u een wond in uw mond heeft, kan het zijn dat uw bloed zich met het speeksel vermengt en u daardoor enkele dagen roze/licht rood speeksel heeft. Dit is normaal. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

De eerste week na de behandeling is het belangrijk dat u niet rookt en/of alcohol drinkt. Dit is slecht voor de wondgenezing.

Er zijn geen beperkingen voor het eten en drinken. Het is juist belangrijk dat u goed blijft kauwen. U kunt eventueel de eerste 3 tot 4 dagen na de behandeling tussen de maaltijden op een suikervrije kauwgum kauwen.

Richtlijnen

De dag van de behandeling en de dag erna kan nog wat bloed uit uw neus of mond komen. Dit is een normaal gevolg van de behandeling en stopt vanzelf.

Vermijd grote drukverschillen tussen mond en neus. Houd u daarom **drie weken** aan de volgende richtlijnen:

- Voorkom dat u kou vat.
- Niet uw neus snuiten, alleen afvegen.
- Houd uw mond wijd open als u moet niezen.
- Bespeel geen blaasinstrumenten.
- Geen ballonnen opblazen.
- Niet te zwaar tillen.
- Geen druk zetten met de stoelgang.
- Eventueel 's nachts half rechtop slapen.
- Gebruikt u een C-pap in verband met apneu, deze **3 weken niet** gebruiken.

Bijverschijnselen

U kunt de volgende bijverschijnselen verwachten:

- Pijn gedurende vier tot vijf dagen;
- Zwelling;
- Nabloeding;
- Koorts gedurende drie tot vier dagen.

Deze bijverschijnselen zijn op zich geen reden om u ongerust te maken. Hieronder is te lezen wat u eraan kunt doen.

Pijn

Nadat de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers. Welke pijnstillers voor u het meest geschikt zijn zal met u overlegd worden. Zo nodig krijgt u een recept hiervoor.

Zwelling

Na de behandeling kan uw wang flink gaan zwellen. Dit is een normaal gevolg van de behandeling. De zwelling zal na twee tot drie dagen het grootst zijn en daarna weer afnemen.

Door uw wang te koelen is de zwelling enigszins te voorkomen.

Koelen kunt u doen met ijsklontjes in een plastic zakje in een washand, een koud washandje of een icepack (een soort gel in een plastic zak). Het beste kunt u direct na de behandeling beginnen met koelen en dit de rest van de dag met pauzes tussendoor blijven doen.

Zonnewarmte kunt u het beste vermijden.

Soms ontstaat er ook een bloeditstorting. Uw wang blijft dan langer dik en verkleurd. Dit is niet ernstig en gaat meestal vanzelf over.

Nabloeden

De eerste uren na de behandeling kan de wond nog iets bloeden. Dat gaat meestal vanzelf over. Wanneer de wond na enige tijd (verschilt per patiënt) nog blijft bloeden (dikke klodders donker rood bloed), dan kunt u het volgende doen.

U neemt een nieuw gaasje of een schone zakdoek en maakt daarmee uw mond schoon en droog. Zeker **niet** gaan spoelen!

Dan neemt u een tweede gaasje en vouwt dat dubbel. Als u geen gaasjes heeft kunt u ook een knoop in een schone zakdoek leggen. Het opgevouwen gaasje of de knoop legt u op de wond en u klemt uw kaken een half uur stevig op elkaar. Het is belangrijk dat er druk op de wond wordt uitgeoefend, waardoor de bloeding stopt.

Wanneer moet u contact op te nemen?

- Als de wond ondanks uw maatregelen blijft bloeden.
- Wanneer na vier of vijf dagen de pijn en/of zwelling niet minder wordt, maar juist toeneemt.
- Als u koorts krijgt boven de 38,5°C. Een kleine verhoging is normaal.
- Als u een toenemend vol/drukkend gevoel onder de ogen of op het wang krijgt.
- Als er viezigheid uit de neus komt.
- Wanneer u merkt dat er lucht of vloeistof via de mond in de neus komt.

Natuurlijk kunt u altijd bellen wanneer u vragen heeft of zich ongerust maakt.

Polikliniek Mond-Kaak-Aangezichts chirurgie

Telefoonnummer: (0475) 38 21 21

Samengevat

- Goed koelen.
- Goede mondhygiëne. Tand en kiezen na elke maaltijd poetsen evenals het wondje.
- **Vijf** dagen **niet** spoelen.
- Goed kauwen. Geen maaltijden overslaan en niet uitsluitend vloeibaar voedsel eten.
- Eventueel suikervrije kauwgum nemen.
- **Eén** week **niet** roken en alcohol drinken.
- Apneu patiënt 3 weken C-PAP niet gebruiken.
- Vermijd grote drukverschillen tussen mond en neus.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34277710 - Mond kaak en aangezichts chirurgie (MKA) - juli 2024