



Tarsale tunnelsyndroom

Depo-Medrol injectie

U heeft zojuist een injectie gekregen met Depo-Medrol ter behandeling van het Tarsale tunnelsyndroom (beknelling van de zenuw aan de binnenkant van de enkel en de hiel). Deze folder geeft u informatie over de werking van de Depo-Medrol injectie.

Behandeling

Depo-Medrol is een corticosteroïd (bijnierschors hormoon) met een ontstekingsremmende werking. De werkzame stof is methyl-prednisolon.

Het medicijn wordt in de enkel geïnjecteerd samen met een plaatselijk verdovend middel Lidocaïne. De verdovende werking van Lidocaïne is kortdurend.

Depo-Medrol wordt niet in een bloedvat of spier gespoten, maar in het tussenliggend weefsel vlak vóór de tarsale tunnel.

Bijwerkingen van het geneesmiddel zijn bij af en toe gebruik niet te verwachten.

Of de injectie bij u heeft geholpen, wordt 1 tot 7 dagen na de behandeling duidelijk. Soms duurt het wat langer voordat de behandeling resultaat heeft.

Na de behandeling

U kunt na de injectie een aantal uren een doof gevoel in de voet hebben. De tintelingen, die u al kent, kunnen wat meer zijn dan u gewend bent. Deze tintelingen verdwijnen vanzelf. Soms duurt dit een paar dagen.

Het gebruik van pijnstillers is niet nodig, maar mag wel naar eigen inzicht.

Klachten of vragen

Blijven de klachten of heeft de injectie onvoldoende resultaat? Neem dan na 6 weken telefonisch contact op met de polikliniek neurologie.

Het telefoonnummer is (0475) 38 27 71.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34294600 - Neurologie - juli 2024