



Sedatie en pijnstilling op de spoedeisende hulp

Wat is sedatie?

Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te geven, maar ook een sederend middel. Sedatie betekent 'het verlagen van het bewustzijn van een patiënt'. Dit gebeurt door het toedienen van medicijnen via een infuus in uw arm of hand. Hierdoor valt u in een lichte slaap. Zo kunt u een pijnlijke of vervelende ingreep makkelijker ondergaan, met minder pijn en stress. De medicijnen werken kortdurend waardoor u na het onderzoek snel wakker bent.

Wat gaat er gebeuren?

Allereerst zal de verpleegkundige bij u een infuus prikken in de onderarm of op de handrug. Via dit infuus kan medicatie in de bloedbaan worden toegediend. Om u tijdens de ingreep goed in de gaten te kunnen houden wordt u aangesloten op een monitor die uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed meet.

U krijgt ook extra zuurstof via een neusbrilletje toegediend.

Na het toedienen van de medicatie valt u snel in slaap en volgt de ingreep. Kort hierna wordt u weer wakker, maar kunt u zich nog wel slaperig voelen. Door de medicatie weet u vaak niet meer goed wat er tijdens de ingreep is gebeurd.

Bij elke ingreep is er minimaal 1 ervaren arts en een verpleegkundige die hiervoor is opgeleid aanwezig.

Na de sedatie

Na afloop van de ingreep wachten we totdat u goed wakker bent. Gedurende deze tijd worden de vitale functies bewaakt: de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed. Als de medicatie goed is uitgewerkt en u goed wakker bent mag de infuusnaald eruit.

Wanneer mag ik naar huis?

Na de behandeling mag u naar huis indien:

- U goed wakker bent
- Uw hartslag en bloeddruk goed zijn
- U kunt drinken en niet misselijk bent
- U rechtop kunt zitten en niet duizelig bent

Indien nodig krijgt u pijnstillers mee naar huis.

Advies

Wij adviseren u na het onderzoek geen activiteiten te doen, waarbij coördinatie of alertheid nodig zijn. Bijvoorbeeld: autorijden, fietsen, machines of elektrisch gereedschap bedienen. U mag na de behandeling niet zelf autorijden. Als u een ongeval veroorzaakt, bent u niet verzekerd! Gebruik de eerste 12 uur geen alcohol of drugs.

Wanneer moet ik een arts waarschuwen?

Als u last krijgt van onderstaande klachten neem dan telefonisch contact op met de Spoedeisende Hulp, tel 0475-382254.

- Misselijkheid en/ of braken
- Andere klachten die u niet vertrouwd.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw behandelend arts of bel naar de Spoedeisende Hulp waar u behandeld bent.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34296490 - Spoedeisende Hulp - november 2024